

## **Hinweise für Patienten nach chirurgischen Eingriffen**

### **1. Schmerzen**

- Wenn Sie irgendwelche zusätzliche Medikation, ihr Zahnarzt und Arzt konsultieren!
- Es wird empfohlen, die erste Tablette während der Narkose zu nehmen, 30 Minuten nach dem Verfahren.
- Nach der Operation ist es möglich, Schmerzen im betroffenen Bereich die ersten Tage, die durch Schmerzmittel gelindert werden sollte zu erleben.
- Verwenden Sie kein Aspirin, Andol oder andere Medikamente, die Acetylsalicylsäure enthalten, weil sie Blutungen verursachen kann.
- Der Patient kann bis zu 6 Ibuprofen 400 mg Tabletten täglich.
- Mäßige schmerzen Mai letzten für 3-5 Tage, und im Fall von schwerer Intensität Schmerz nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf!

### **2. Entlüftung**

- Leichte Blutungen nach dem Eingriff ist völlig normal.
- Halten Sie einen Tupfer/Gaze, die Sie nach der Operation erhalten Sie mit Zähnen für mindestens 20 Minuten gepresst.
- Wenn stärkere Blutungen später auftritt, einen sauberen Gaze auf dem bedienten, Squeeze mit Zähnen und halten Sie es so ca. 20 Minuten.
- Falls die Blutung nicht aufhört, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf!

### **3. Schwellungen**

- Die Schwellungen, die durch die Platzierung eines Eis auf der Wange (10 Minuten mit 10 Minuten Pause) über den op-Bereich sofort nach der Operation gelindert werden können.
- Es ist ganz normal, dass die Schwellung ist die stärkste zweiten und dritten Tag. Nach Ablauf dieser Frist, Schwellung sollte zurücktreten.
- Wenn die Schwellung nicht nach 4 Tagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

### **4. Wunde HYGIENE**

- Spülen ist während der ersten 24 Stunden empfohlen.

- Nach dieser Zeit es okay ist, zu spülen, aber entsprechend den Anweisungen, 2-3 x täglich, bis zu 2 Wochen. Im Allgemeinen, chlorhexidin Lösung (Curasept) oder Gel mit Hyaluronsäure (Gengigel) wird empfohlen.
- Patienten sind immer geraten, richtige und regelmäßige Mundhöhle hygiene durchzuführen, wie es für eine gute Heilung und erfolgreichen Betrieb Ergebnis entscheidend ist.
  - Nicht die Zähne putzen, und vermeiden Sie kauen auf der Seite wurde das Verfahren durchgeführt.
    - Hygiene der anderen Zähne ist wie gewohnt durchgeführt.
    - Entfernung der Fäden nach einer Woche durchgeführt.
  - Stellen Sie keine Zigaretten für die ersten 2-3 Tage verbrauchen.